

Задание 1. Анализ распределения температуры воды по вертикали в озерах Беларуси (до 25 баллов)

1. Изучите приведенную ниже справочную информацию касательно распределения температуры воды по вертикали в озерах Беларуси.

В озерах Беларуси наблюдаются отличия в распределении температуры воды по глубине в разные поры года, что обусловлено сезонными изменениями процессов теплообмена и особенностями перемешивания водной массы.

Изменение температуры водной массы озера происходит как следствие процессов поступления на поверхность воды солнечной радиации и теплообмена между воздухом и водной массой озера, которые имеют отчетливый годовой ход. Очевидно, что наибольшие изменения температуры воды в озере наблюдаются на его поверхности. В результате конвекции (вертикального перемешивания частиц воды в связи с их различной плотностью), а также в результате динамических явлений (волнения, течения) и теплопередачи тепло проникает в глубину водной массы, также приводя к изменению температур.

Следует отметить, что охлаждение либо нагревание нижних слоев воды в пресных озерах в результате конвекции возможно только в том случае, когда температура верхних слоев воды изменяется (понижается или повышается) в направлении к 4 °C (температура наибольшей плотности). При охлаждении (при температуре выше 4 °C) или нагревании (в пределах от 0 °C до 4 °C) верхних слоев воды их плотность увеличивается. Как следствие, происходит погружение данных слоев на глубину и их замещение менее плотными (более легкими) глубинными слоями воды. Таким образом, возникающее конвективное перемешивание воды обуславливается разной плотностью воды на различных глубинах и прекращается, когда вся вода в озере принимает однородную температуру, равную температуре, приближающейся к температуре наибольшей плотности. Такое состояние в озере называется гомотермией и характерно для переходных периодов термического режима – весны и осени. При охлаждении воды до температуры ниже 4 °C в результате динамических явлений и теплоотдачи ее поверхностные слои становятся легче нижележащих слоев (более теплых и плотных). Вследствие этого в зимний период температура поверхностного либо подледного слоя воды близка к 0 °C. С глубиной температура воды увеличивается и у дна в большинстве водоемов составляет около 1,5–4,0 °C (чем глубже озеро, тем ближе к 4 °C). Такое изменение температуры воды в озере с глубиной называется обратной термической стратификацией. Весной, после наступления гомотермии, при последующем накоплении тепла в процессе нагревания озера его верхние слои в результате динамических явлений и теплопередачи становятся более теплыми и легкими. С глубиной вода становится более холодной и плотной. Такое распределение температуры воды в озере по глубине называется прямой термической стратификацией.

В глубоких пресных озерах Беларуси летом, при прямой термической стратификации формируются три слоя воды. Сильно и равномерно нагретый верхний слой воды – эпилимнион – подстилается более холодным и глубинным слоем – гиполимнионом. Между эпилимнионом и гиполимнионом образуется слой температурного скачка – металимнион, для которого характерно понижение температуры с глубиной. Металимнион является как бы буферным слоем, выше которого происходит динамическое перемешивание водных масс озера, а ниже формируется более устойчивое состояние температуры воды, медленно изменяющейся с глубиной. Положение металимниона в озере, а также характерный для него вертикальный градиент температуры зависят от глубины динамического перемешивания, а также от температуры вод двух других слоев – эпилимниона и гиполимниона.

Для эпилимниона характерны наиболее благоприятные экологические условия (большое количество света, тепла, растворенного кислорода), которые способствуют развитию планктона и nekтона. В металимнионе, в результате достаточно резкого падения

температуры, меняется газовый режим и уменьшается количество водных микроорганизмов, что сокращает объем других групп живых организмов. В слое гипolimниона существенно сокращается количество освещения, что приводит к практически полному исчезновению количества растительных организмов. Здесь сокращается, нередко до нуля, содержание кислорода, присутствует и может накапливаться образующийся в результате разложения органики и губительный для всего живого сероводород.

2. На основе данных наблюдений за температурой воды в предложенных ниже озерах постройте графики распределения температуры воды в них по вертикали для периодов обратной термической стратификации, гомотермии и прямой термической стратификации.

Графики создайте на листе миллиметровой бумаги. В верхней части листа расположите три совмещенных графика (обратная термическая стратификация, гомотермия и прямая термическая стратификация) для первого озера, в нижней части листа – для второго.

Данные распределения температуры воды в оз. Рудаково

Глубина (м)	Температура воды (°C)		
	26.01.2015	05.05.2015	29.07.2015
Поверхность	0,4	7,4	21,8
2,0	1,0	7,3	21,2
5,0	1,3	7,3	20,8
7,0	н. д.	н. д.	15,1
10,0	1,8	7,2	11,2
13,0	н. д.	н. д.	10,5
16,0	2,0	н. д.	9,0
20,0	2,8	7,1	7,3
25,0	н. д.	н. д.	6,3
28,0	3,6	7,1	6,0

Примечание: н.д. – нет данных

Данные распределения температуры воды в оз. Отолово

Глубина (м)	Температура воды (°C)		
	11.03.2015	10.07.2015	11.11.2015
Поверхность	0,4	21,7	3,0
1,0	0,7	21,5	3,0
2,0	1,5	20,8	н. д.
3,0	н. д.	20,1	3,0
4,0	1,8	19,0	н. д.
5,0	1,9	18,3	3,1
6,0	н. д.	12,2	н. д.
8,0	2,5	9,9	3,2
12,0	3,0	8,5	3,2
16,0	3,4	6,1	3,2

3. На кривых прямой термической стратификации озер выделите слои эпилимниона, металимниона и гипolimниона.

4. В тексте-описании произведите сравнительный анализ графиков распределения температуры воды в предложенных озерах по вертикали для периодов обратной термической стратификации, гомотермии и прямой термической стратификации. Сопоставьте положение слоев эпилимниона, металимниона и гипolimниона в период прямой термической стратификации.

5. В тексте-описании сделайте сравнительное заключение по предложенным озерам об их экологической устойчивости к антропогенному загрязнению для принятия хозяйственных экологоориентированных решений. Свое заключение обоснуйте и подкрепите конкретными фактами.

Критерии оценивания.

Графическая часть:

- правильность нанесения линий распределения температуры воды по вертикали для периодов обратной термической стратификации, гомотермии и прямой термической стратификации для первого озера – **до 3 баллов**;
- правильность нанесения линий распределения температуры воды по вертикали для периодов обратной термической стратификации, гомотермии и прямой термической стратификации для второго озера – **до 3 баллов**;
- правильность выделения слоев эпилимниона, металимниона и гипolimниона – **до 3 баллов**;
- наличие общего названия графиков (либо отдельно названий графиков для первого и второго озер), осей X, Y с подписями единиц измерений – **до 3 баллов**;
- наличие легенды (либо надписей линий на графиках) – **до 1 балла**;
- удачное расположение графиков, адекватность размера – **до 1 балла**;
- аккуратность выполнения – **до 1 балла**.

Аналитическая часть:

- сравнительный анализ графиков распределения температуры воды в озерах по вертикали для периодов обратной термической стратификации, гомотермии и прямой термической стратификации; сопоставление положения слоев эпилимниона, металимниона и гипolimниона в период прямой термической стратификации – **до 6 баллов**;
- сравнительное заключение по предложенным озерам об их экологической устойчивости к антропогенному загрязнению для принятия хозяйственных экологоориентированных решений – **до 4 баллов**.

Задание 2. Анализ биохимического потребления кислорода и концентрации загрязняющих веществ в реках Беларуси (до 25 баллов)

1. Изучите приведенную ниже справочную информацию касательно биохимического потребления кислорода (БПК) и концентрации загрязняющих веществ в реках Беларуси.

Природными источниками органических веществ являются разрушающиеся останки организмов растительного и животного происхождения, как живших в воде, так и попавших в водоем с листьями, по воздуху, с берегов и т.п. Кроме природных, существуют также техногенные источники органических веществ. В естественных условиях находящиеся в воде органические вещества разрушаются бактериями, претерпевая аэробное биохимическое окисление с образованием двуокси углерода. При этом на окисление потребляется растворенный в воде кислород (РК). В водоемах с большим содержанием органических веществ большая часть РК потребляется на биохимическое окисление, лишая таким образом кислорода другие организмы. При этом увеличивается количество организмов, более устойчивых к низкому содержанию РК, исчезают кислородолюбивые виды и появляются виды, терпимые к дефициту кислорода. БПК в речной воде выступает интегральным показателем загрязненности поверхностных вод и отражает количество растворенного кислорода, потребляемого организмами для аэробного разложения органических веществ, присутствующих в воде. В Беларуси показатель качества воды по БПК для поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных составляет не более 3 мг O_2/l .

Аммонийный азот в водах находится, главным образом, в растворенном состоянии в виде ионов аммония и недиссоциированных молекул $NH_3 \cdot H_2O$, количественное соотношение которых имеет важное экологическое значение и определяется величиной pH и температурой воды. В то же время некоторая часть аммонийного азота может мигрировать в сорбированном состоянии на минеральных и органических взвешах, а также в виде различных комплексных соединений. Присутствие в незагрязненных поверхностных водах ионов аммония связано, главным образом, с процессами биохимического разложения белковых веществ, мочевины, дезаминирования аминокислот. Естественными источниками аммиака служат прижизненные выделения гидробионтов. Кроме того, ионы аммония могут образовываться в результате анаэробных процессов восстановления нитратов и нитритов. Источником антропогенного загрязнения водных объектов ионами аммония являются сточные воды многих отраслей промышленности, бытовые сточные воды, стоки с сельскохозяйственных угодий. Аммонийный азот является одним из основных речных загрязнителей. В больших концентрациях он отрицательно воздействует на человека и остальные виды живых организмов. Опасен аммонийный азот тем, что и его ион, и восстановленная форма (аммиак NH_3) способны вступать в реакцию с белками, вызывая их денатурацию. Например, такой белок как гемоглобин, в результате действия этого токсина теряет способность переносить кислород. Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воде поверхностных водных объектов аммонийного азота в Республике Беларусь составляет 0,39 мг N/l.

Загрязнение вод биогенными веществами – это процесс чрезмерного накопления в водоемах питательных веществ, в первую очередь азота и фосфора, которые поступают в основном из неочищенных сточных вод, а также от смыва удобрений с сельскохозяйственных полей. Это приводит к чрезмерному росту водорослей (эвтрофикация), нарушению экологического баланса и снижению качества воды. Загрязнение вод биогенными веществами характеризуется значениями среднегодовых концентраций фосфатов и нитратов, которые сопоставляются с нормой ПДК, в Беларуси в воде поверхностных водных объектов ПДК фосфатов составляет 0,066 мг P/l, нитратов – 40,0 мг NO_3/l

2. Рассмотрите представленные ниже статистические данные по среднегодовому БПК и концентрации загрязняющих веществ в речной воде двух водотоков Беларуси. Представьте эти количественные данные в графическом виде на листе миллиметровой бумаги.

р. Мухавец

Показатель	Единица измерения	Годы							
		2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
БПК	мг О ₂ /л	3,03	2,43	1,84	2,18	2,69	2,39	2,61	2,75
Аммонийный азот	мг N/л	0,32	0,81	0,22	0,22	0,23	0,38	0,31	0,20
Фосфаты	мг P/л	0,07	0,09	0,10	0,08	0,12	0,11	0,12	0,13
Нитраты	мг NO ₃ /л	4,56	4,34	2,84	6,13	3,50	4,66	4,18	3,88

р. Свислочь

Показатель	Единица измерения	Годы							
		2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
БПК	мг О ₂ /л	3,38	2,90	2,28	2,33	2,27	2,26	3,58	4,15
Аммонийный азот	мг N/л	1,10	0,82	0,43	0,40	0,37	0,34	0,25	0,32
Фосфаты	мг P/л	0,07	0,11	0,07	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08
Нитраты	мг NO ₃ /л	4,82	6,99	5,27	6,05	5,95	5,32	4,16	4,88

3. В тексте-описании произведите сравнительный анализ динамики БПК и концентрации загрязняющих веществ в водотоках за рассматриваемый период. С учетом географических факторов дайте объяснение ходу среднегодовых показателей, причинам превышения ПДК.

4. В тексте-описании сделайте прогноз среднегодовых значений БПК и концентрации загрязняющих веществ в изучаемых водотоках на ближайшие 3-5 лет. Свой ответ обоснуйте.

Критерии оценивания.

Графическая часть:

- правильность нанесения линий (при выборе графика как формы отображения данных) БПК и концентрации загрязняющих веществ в речной воде двух водотоков Беларуси; возможен выбор иных форм отображения данных, например, столбчатая диаграмма – **до 8 баллов**;

- наличие общего названия графика (либо отдельно названий графиков для первого и второго водотока), осей X, Y с подписями единиц измерений – **до 3 баллов**;

- наличие легенды (либо надписей линий на графиках) – **до 1 балла**;

- удачное расположение графика (графиков), адекватность размера – **до 1 балла**;

- аккуратность выполнения – **до 1 балла**.

Аналитическая часть:

- сравнительный анализ динамики БПК и концентрации загрязняющих веществ в водотоках за рассматриваемый период; объяснение хода среднегодовых показателей, причин превышения ПДК – **до 7 баллов;**
- прогноз среднегодовых значений БПК и концентрации загрязняющих веществ в изучаемых водотоках на ближайшие 3-5 лет – **до 4 баллов.**


Задание 3. Анализ географических различий в уровне развития сфер торговли и общественного питания (до 30 баллов)

1. В предложенной ниже таблице рассчитайте показатели торговой площади магазинов и посадочных мест в объектах общественного питания в расчете на 10 тыс. жителей по административным единицам области.

2. На бланковке, представленной ниже, сформируйте карту, отображающую информацию о рассчитанных вами показателях. Для пространственной презентации данных используйте любые известные вам картографические способы. Не забудьте осуществить на карте подпись административных единиц.

Уровень развития сферы торговли и общественного питания в Могилевской области, 2024 г.

№	Административно-территориальные единицы	Численность населения, чел.	Суммарная торговая площадь магазинов, м ²	Торговая площадь магазинов на 10 000 чел. населения, м ²	Общее количество посадочных мест в объектах общественного питания, шт.	Число посадочных мест в объектах общественного питания на 10 000 чел. населения, шт.
1	г. Могилев	352896	289975	8217	27349	775
2	г. Бобруйск	205502	163779	7970	13748	669
3	Бельничский р-н	17 194	11722	6817	1137	661
4	Бобруйский р-н	16204	5127	3164	1432	884
5	Быховский р-н	27582	17767	6442	2656	963
6	Глусский р-н	11803	8540	7235	1448	1227
7	Горецкий р-н	37106	25230	6799	3907	1053
8	Дрибинский р-н	9190	4250	4625	1049	1141
9	Кировский р-н	16666	10106	6064	1223	734
10	Климовичский р-н	21605	12448	5762	1767	818
11	Кличевский р-н	13324	8406	6309	1090	818
12	Костюковичский р-н	20904	13687	6548	1904	911
13	Краснопольский р-н	8526	5010	5876	978	1147
14	Кричевский р-н	27335	19516	7140	2291	838
15	Круглянский р-н	12247	8515	6953	1372	1120
16	Могилевский р-н	39163	10528	2688	3321	848
17	Мстиславский р-н	17910	11648	6504	1934	1080
18	Осиповичский р-н	42663	27507	6448	4497	1054
19	Славгородский р-н	11904	7947	6676	726	610
20	Хотимский р-н	9425	5437	5769	887	941
21	Чаусский р-н	16291	8946	5491	1551	952
22	Чериковский р-н	12164	8396	6902	1392	1144
23	Шкловский р-н	23761	14290	6014	2376	1000
Областной показатель		971365	698777	7194	80035	824



3. В тексте-описании выявите группы лидирующих и отстающих административно-территориальных единиц по уровню развития сфер торговли и общественного питания, сравнив их со среднеобластными значениями. Охарактеризуйте полученные географические различия, указав возможные причины и факторы, которые их определяют.

4. В тексте-описании, на основе произведенного анализа, предложите стратегию развития сфер торговли и общественного питания изучаемой области на ближайшую перспективу. Свой ответ обоснуйте.

Критерии оценивания.

Расчеты и картографическая часть:

- правильный расчет статистических показателей в таблице – **до 4 баллов**;
- адекватный выбор способов картографирования для двух статистических показателей – **до 2 баллов**;
- полнота тематического содержания карты, отображающей два статистических показателя – **до 2 баллов**;
- полнота и адекватность формирования легенды карты – **до 2 баллов**;
- наличие правильно размещенных подписей административных единиц на карте – **до 3 баллов**;
- наличие названия карты – **до 1 балла**;
- аккуратность исполнения карты – **до 2 баллов**.

Аналитическая часть:

- выявление групп лидирующих и отстающих административно-территориальных единиц по уровню развития сфер торговли и общественного питания, сравнение их со среднеобластными значениями. Характеристика полученных географических различий, указание возможных причин и факторов, которые их определяют – **до 8 баллов**;
- стратегия развития сфер торговли и общественного питания изучаемой области на ближайшую перспективу – **до 6 баллов**.